難峯普濟方

雞峯普濟方卷第十五

馮翊賈兼重校定

婦人　崩漏

熟乾地黄煎　治婦人虛損或頭風入腦及寒痺筋脉緩急血閉無子遊風往來或漏下赤白或月水不通無所不治

白芷　石斛　蓯蓉　細辛　防風
卷栢　厚朴　白茯苓　白朮　甘草
桂　乾薑　山藥　禹餘粮　石膏
赤石脂　澤蘭葉　蕪荑各壹兩　川椒　人參各柒兩半
杜仲　虵床子　續断　艾葉各叁兩叁分
當歸　熟地黄　牛膝　五味子　川芎各柒兩半
藁本柒兩　紫石英拾伍兩　栢子仁柒兩

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大每服空心米飲下三十元

大五石澤蘭元

治婦人風虛腹內雷鳴緩急風頭痛寒熱月經不調繞臍惻惻痛或心腹痞堅逆食手足冷多夢紛紜身躰痺痛榮衛不和虛弱不能動揺及産後虛損並宜服此（千金翼有陽起石壹兩）

鍾乳粉　禹餘粮（各壹兩半）　石膏　白石英（各貳兩）

紫石英（貳兩半）　澤蘭葉（貳兩壹分）　蜀椒

乾薑（貳兩）　當歸　桂　芎藭　厚朴

栢子仁　熟乾地黄　細辛　茯苓

五味子　龍骨　甘草　黄耆（各貳兩半）

石斛　遠志　人參　續斷　白术

防風　烏頭各壹兩壹分　山茱萸　紫苑各壹兩

白芷　藁本　蕪荑各叁分

重校定此方內蜀椒無分兩其本方內又有栢子仁元与此方治療相類內蜀椒用壹兩半

右爲末蜜元如梧桐子大空心温酒服二三十元

澤蘭散 治婦人產乳百疾安胎調氣產後血暈亡血血積虛勞無子有子墮胎難產子死腹中胎衣不下婦人血注遍身生瘡經候不調赤白帶下乳生惡核咳嗽寒熱氣攻四肢處女任脉不調常服調血有子

澤蘭玖分　石膏捌分　當歸　赤芍藥　白蕪荑

甘草　芎各拾分　桂伍分　生乾地黃陸分

桔梗　厚朴　吴茱萸　白茯苓　防風
卷柏　細辛　栢子仁各肆两　人參
白芷　藁本　椒紅　乾薑　烏頭
五味子　黄耆　白术各叁分　白薇　丹參
阿膠各貳分

右爲細末每服二錢空心熱酒調下丸不美飲食四肢困倦者尤宜服之

栢子仁元治婦人五勞七傷羸冷瘦削面無顔色飲食減少貌失光澤及産後斷緒無子久服令人肥白補虚

栢子仁　黄耆　乾薑　鍾乳　白石英
紫石英各貳两　蜀椒壹两半　杜仲　當歸

甘草　芎藭各肆拾貳銖　厚朴　桂
白朮　細辛　獨活　人參　石斛
白芷　芍藥　五味子　桔梗　蓯蓉
赤石脂各壹兩　澤蘭貳兩陸銖　藁本　蕪荑各拾捌銖
烏頭一方作牛膝　乾地黃各壹兩陸銖
右爲細末煉蜜和元如梧桐子大每服三十元酒下千
金翼無烏頭有龍骨防葵茯苓秦艽各半兩爲三十二
味并治產後半身枯悴

紫菀煎 治婦人久患血勞血氣腹內積聚惡物症癖氣塊腹內去來或上衝心兩肋虛脹腰脥冷疼臍下攪刺脾胃不和喫食無味口吐清水渾身麻痺手脚拘急口燥唇乾

身躰虛弱睡卧不安心神煩躁面上生瘡四肢沉重月水不調經年累月無時似有孕漸加羸瘦及治一切諸風久不差者悉宜服之

紫苑　人參各捌分　熟地黄陸分　麥門冬　柴胡

蜀椒　烏頭　羌活　甘草各伍分　厚朴

大黄　茯苓　黄連各陸分　巴豆　檳榔

車前子　蓯蓉　防葵　吴茱萸　菖蒲

當歸　伏神　乾薑　皂角　桔梗各肆分

防巳　白朮各伍分　肉豆蔻貳分

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大每服三五元空心米飲下當宣轉三五行如不定以白粥止之

大聖散治婦人產前後一切疾患大能安胎和氣或子死腹中攻刺疼痛產後血暈血癖血滞血崩血勞血入四肢應是血臟患者并胎衣不下及傷寒嘔逆遍身生瘡經候不調赤白帶下乳生惡氣咳嗽寒熱氣攝四肢室女紅脉不調並宜服之如或子臟虛冷頻頻墜胎及孕娠後乖違將攝因成疾並可服之若常服即和顏色血海安寧飲食進美舉止康強丈夫服之亦療五勞七傷

澤蘭玖分　白术　人參　白芷　藁本

乾薑　黄耆　五味子　丹參各叁分　川椒

厚朴　桔梗　防風　白茯苓　栢子仁

細辛各壹兩　生乾地黄壹兩半　吴茱萸　卷栢各肆分

當歸 芍藥 川芎 甘草 白蕪荑各柒分

石膏貳兩 肉桂伍分 白薇貳分 阿膠半兩

右件藥並揀擇令淨分兩足焙乾爲細末每日空心熱酒調下一錢婦人一切疾病但請服之

琥珀元 治婦人血風勞

琥珀 木香 檳榔 芎 防風

桂 乾薑 附子 京三稜各伍分

青皮 吴茱萸 白芷 草豆蔻 紅芍藥

天麻 栢桼 吴白朮各叁分 當歸壹分

桃仁 鼈甲 敗龜各陸分 人參 柴胡各[illegible]分

乾蝎壹分 重校定此方内三味无分兩此方王氏博濟方亦載之内人參柴胡各貳分乾蝎壹分

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大每服十五二十元荆芥湯下不以時

順經元 補虛損調順經血治衝任氣虛小腹挾寒月水不調臍腹疞痛腰腿沉重四肢倦怠百節酸疼心忪恍惚憂恐不樂面少光澤飲食无味除下臟風冷治帶下三十六疾崩中漏下五色子臟久冷無子及數墮胎兼療産後惡露不下餘血不盡臍腹疼痛憎寒發熱血逆上衝狂言目瞑或乘虛中風口噤不語身躰不遂頭旋身戰臨月服之壯氣養胎正順生理潤胎産後常服滋養血氣和調陰陽密腠理實腑臟治虛風除痼冷

當歸　石膏　蜀椒　甘草　蟬退

馬鳴退各貳兩 栢子仁 白薇 藁本

乾薑 白朮 白蕪荑 蒼耳 人參

白芍藥 芎 附子各壹兩 食茱萸 厚朴

防風 白芷各伍分 桔梗叁兩 澤蘭玖分 生犀半兩

右爲細末煉蜜和元如弾子大每服一元温酒或米飲

化下空心服

石脂澤蘭散 治産後風虛

澤蘭玖分 禹餘粮拾分 石膏 白芷 乾地黄

赤石脂 肉蓯蓉 鹿茸 芎藭各捌分 藁本

蜀椒 白朮 栢子仁各伍分 桂

甘草 當歸 乾薑各柒分 蕪荑 細辛

厚朴 人參叁分 防風拾分

右二十二味爲細末酒服方寸匕日三以意增之

補益鍾乳元 治婦人血海虛上攻於肺或時喘促心煩喫食少味四肢乏力

鍾乳粉叁兩 五味子 肉蓯蓉 澤蘭 芎藭

白芍藥 黃耆 桔梗 栢子仁 當歸

紫石英 紫菀 厚朴各壹兩 天門冬壹兩半

甘草 細辛各半兩 遠志 天雄 蒲黃

蕪荑仁各貳分 熟乾地黃叁兩

右爲細末煉蜜和杵五七百下元如梧桐子大每服三十元空心及晚食前溫酒下

玉進散 各依法製治氣虛有熱狀如勞瘵者

山藥 柒兩半 當歸 桂 神麴 熟地黃

大豆卷 各貳兩半 甘草 人參 各壹兩柒錢半

芎 白芍藥 白朮 麥門冬 杏仁

柴胡 白茯苓 各壹兩捌分 阿膠 壹兩柒分 乾薑 叁分

白斂 兩半 防風 壹兩半 棗 壹伯 桔梗 壹兩

右爲細末每服三錢食前溫米飲調下

昆布煎 治婦人胷中伏氣

昆布 海藻 芍藥 人參 款冬花

白石英 桑白皮 桂 各弍兩 栢子仁 茯苓

鍾乳粉 各弍兩半 紫菀 甘草 各壹兩 吳茱萸

五味子 細辛各壹兩半 杏仁壹兩 生薑片切焙乾

橘皮黃者 紫蘇子各伍合

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服二十元生薑湯

下不以時

白堊圓治婦人月經一月再來或隔月不來或多或少淋瀝不斷或來而腹痛噓吸短氣不能飲食心腹刺痛所下或青或黃黑色或如水莘躰沉重

白堊 白石脂 牡蠣 禹餘粮 烏魚

龍骨 細辛 當歸 白芍藥 黃連

茯苓 薑 人參 瞿麦 石草

白芷 白歛 附子 甘草 桂各壹兩

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大空心温酒下三十元

小活血丹 治血臟虛冷面黃肌瘦骨膈痞悶心腹撮痛嘔逆惡心面生黑黯鬚髮脫落頭旋目黑經候不勻腰腿酸疼脇肋脹痛不欲飲食手足煩熱肢節拘倦一切血氣虛羸皆治之

安息香　當歸　延胡索　木香　桃人

栢子仁各貳兩　澤蘭葉　牡丹皮　乾薑

黃耆　桂心　艾葉各肆兩　大附子　虎杖

山茱萸　吴茱萸　杜仲各貳兩　肉蓯蓉　厚朴捌兩

重校定此方内蓯蓉元分兩具太平聖惠方内白薇元治療藥味相類内蓯蓉合用肆兩

右爲細末以前安息香杵碎好酒同研去滓銀器内慢

火熬成膏入白麵少許同煑作麵糊爲元如梧桐子大每服二十元温酒下淡醋湯亦可空心食前服

安息香元治血臟虚冷面黄肌瘦胷膈痞悶心腹絞痛嘔逆惡心面色黑䵟鬢髮脫落頭旋眼黑經候不勻腰腿疼痛脇肋脹滿不欲飲食手足煩熱肢節酸疼或寒或熱發歇無時

安息香　桃仁　虎杖　附子　杜仲

山茱萸　吴茱萸　栢子仁　木香　當歸

延胡索各貳兩　澤蘭　艾葉　乾薑

牡丹皮　黄耆　桂　蓯蓉　厚朴各壹兩

右爲細末醋煑麵糊和元如梧桐子大每服二十元空

心温酒下

澤蘭元 治風虛中寒腹內雷鳴頭痛寒熱月經不調繞臍惻惻榮衛不和不能動揺產後虛損

澤蘭貳兩壹分　石膏貳兩　當歸　甘草各壹兩叄分

栢子仁　防風　茯苓　芎各壹兩　白芷

蜀椒　藁本　細辛　食茱萸　蕪荑

人參　厚朴　白朮　桂各叄分

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大每服二十元食前温酒下

萬安散 治下經不足冷氣攻衝脇肋脹疼小腹堅滿氣不施化小便不利及婦人衝任宿寒臍腹刺痛經候不勻肢

躰疼倦

仁參　茯苓　木香　芍藥　川練子

芎　厚朴　神麹　麦蘗　乾薑

熟地黄　芪　當歸　枳殼　茴香

青皮　荆三稜　桂各壹兩

右爲麄末每服二錢水一盏葱白二寸煎至七分去滓

食前温服

人參禹餘粮元 若經候乍多乍少或前或後臍腹時痛面

色不澤久不治之漸至虛損令人斷產变生他病此由衝

任虛弱後至榮衛不調或陰乘陽胞寒氣冷血不運行故

令乍少當調其陰陽順其血氣論曰經者有常候謂候一

身之陰陽從伏知安危血過於陽則前期而來過於陰則後期而至其有乍多乍少斷絶不行崩漏不止亦由陰陽衰盛寒熱爲邪

禹餘粮　龍骨　人參　桂　紫石英

川烏頭　桑寄生　杜仲　五味子　遠志各二兩

澤瀉　當歸　石斛　蓯蓉　乾薑

川椒　牡礪　甘草各一兩

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大每服米飲下二十元漸加至三十元日三服空心食前

若經道不通繞臍寒痛上下脉沉緊此由寒客血室血凝不行結積不散積血爲氣所傳新血与故血相搏所

以發痛譬如天寒地凍水凝成氷宜溫經湯桂枝桃仁湯產後大便秘澁由內無津液腸胃乾燥宜紫蘇元

紫蘇元方見大腸門桂枝湯見第十七卷

牡丹元 大暖婦人血海冷敗傷損壯顏色氣力

牡丹皮　白薇　肉豆蔲　當歸　熟地黃

禹餘粮　蓯蓉　木香各貳兩　吴茱萸　細辛

獨活　茯苓　石膏　芎各壹兩　黃耆

五味子　桂各叁分　椒半兩

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大每服三十元空心溫醋湯下

土瓜根元 療月經不通六七年或腫滿氣逆腹脹瘕痛之

蠐螬壹升　熟地黃　牡丹　乾漆　赤芍藥

牛膝　土瓜根　桂各肆兩　桃仁　黃芩

牡蒙各叁兩　海藻　茯苓各伍兩　䗪蟲肆伯个　水蛭叁伯个

芒消貳兩　人參陸分　茱萸貳兩

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大空心温酒下七元

補益阿膠元　治婦人風虛勞損經血過多臟腑虛乏面色萎黃四肢羸瘦腹內時痛不欲飲食

阿膠　白龍骨　鹿茸　人參　白茯苓

當歸　白朮　厚朴　石斛　黃耆

熟乾地黃各壹兩　白芍藥　乾薑　卷栢

桂　　芎藭　蒲黃各半兩　艾葉叄分

右爲細末煉蜜和杵三二百下元如梧桐子大每服四十元空心晚食前以粥飲下

紫石英元治婦人風虛勞冷經候不調四肢不能飲食不入

紫石英　熟乾地黄　白石英各叄兩

續斷　木香　桂　當歸　白朮

白芍藥　乾薑　白薇各半兩　牛膝　芎藭

五味子　人參各叄分　黃耆　附子　椒紅各壹兩

右爲細末煉蜜和杵五七百下元如梧桐子大每服三十元食前温酒下

馬蹄元治婦人崩中帶白重校定馬蹄元小薊根疑是小薊根恐傳寫之誤

白馬蹄伍兩　白馬鬐毛　蒲黄　鹿茸
禹餘粮　白芷　續斷　小薊根各肆兩
人參　乾地黄　栢子仁　黄耆　茯苓
當歸　烏賊骨各壹拾兩　伏龍肝　蓯蓉
艾葉各叁兩

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大空心米飲下二十元日再加至四十元

勝金元散治婦人諸疾相須並濟凡漏下過期不産近年此病甚多亦不須深慮有服藥後漏止胎便長進而産者亦只恁迤邐却便平復此緣未受胎時衝任有風邪停滯

於內或從產後或從經候來時便利於懸廁之上風從下入得之但只服此勝金元散自然作効經驗多矣

白薇半兩　人參　藁本　蒲黃　川烏頭

丹參各叁分　吴茱萸　栢子仁　防風　厚朴

細辛各貳分　桂心　乾薑各壹兩壹分　當歸

芎藭各壹兩叁分　生乾地黄捌兩　澤蘭貳兩壹分

右除桂心外同杵以馬尾羅子篩爲麤末重炒褐色勿焦候冷再杵爲細末入桂心末拌和勻後分爲兩處候合成後藥取一半入在此藥中却將此藥一半入在後藥中

元子如後

延胡索　五味子　白芷　白术　石菖蒲各叁分

茯苓　桔梗　卷栢　川椒各壹兩　黄耆壹兩

白蕪荑　甘草　白芍藥各壹兩叁分　石膏壹兩

右件除石膏外同杵以馬尾羅子篩爲麁末重炒令褐色候冷依前再杵爲細末入石膏拌勻亦分作兩處將一半換前藥相和勻煉蜜和元如梧桐子大如有病證每服用温酒調前散三錢下此元三十元常服二錢下此元二十元此元散効不可述應婦人室女病至垂死服之無不見効若只服元子不可無散子服散子不可無元子政以相須並濟名之爲勝金元散修合時宜精潔在意爲妙凡風勞氣冷傷寒咳嗽嘔逆寒熱不定四

肢遍身瘡痒血海不調血臟虛憊赤白帶下血運血崩
除血流入四肢頭痛惡心血瘕積滯產前預服則安胎
易生產後諸般疾患但下得藥即使安愈常服此疾不
生悅懌顏色素無子者服之有驗兼治丈夫腎臟虛風
等疾

桑耳散 治婦人帶下赤白無問遠近皆治

桑耳　熟乾地黃　丹參　阿膠
牛角腮　牡蠣　鹿茸　鱉甲　赤石脂
薤葉各壹兩　芎藭　熟艾　小薊根　當歸
地榆　續斷　柏葉各叁分

右為細末每服於食前以溫酒調下二錢

槐耳丸治女人白崩及痔病連血臟服諸藥不差者

槐耳　白斂　艾葉　蒲黃　白芷各壹兩

黄耆　人參　續斷　禹餘粮　當歸

橘皮　茯苓　蝟皮　乾地黄各叁兩

牛角腮　馬白蹄各肆兩　猪後懸蹄貳拾壹个

右爲細末酒煑麵糊爲丸如梧桐子每日空心酒下二十丸日二服

古今錄驗澤蘭丸療産後虚風羸瘦百病必効方

澤蘭陸分　白芷　川椒　蕪荑　藁本

細辛各肆分　栢子仁　白朮　人參　桂

防風　厚朴　丹參各伍分　芎藭　甘草

當歸各柒分　乾地黃拾分

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大每服二三十元空心醋湯下

荊芥柴胡散 治處女氣虛血海不調時發寒熱目澁舌乾身躰困倦忪氣短不思飲食小便赤澁大便或秘澁瘦弱面色萎黃變爲勞疾宜服

鱉甲　柴胡　荊芥穗　人參　白朮

綿黃耆　延胡索各壹兩　赤芍藥　當歸

熟乾地黃　木香　青橘皮　黃橘皮

桑白皮　地骨皮　甘草各半兩

右爲細末每服一錢水一盞生薑三片煎至七分去滓

温服日午臨卧各一服此疾不可躁利與熱藥針灸服之甚有効

人參散治婦人產前產後虛風上攻頭旋目暈四肢少力手足顫掉肌肉瘦瘁胷膈痞滿臟腑不調狀若虛勞春秋發歇寒熱作時口苦舌乾心忪短氣咳嗽上喘多驚愛睡昏沉困倦嘔逆痰涎不思飲食腹脇脹滿皆可治之不限老少盡可服食常服生肌肉活血脉除百病進飲食

人參　麦門冬各叁分　沉香　桔梗

鱉甲　當歸　白术　生乾地黄

芎藭各半兩　赤茯苓　阿膠　甘草各壹分　青木香

陳橘皮　黄耆　菊花各壹兩

右爲細末每服二錢水一盞煎至七分去滓食前温服

內補黃耆湯 治婦人五勞七傷身躰疼痛小腹急滿面目黃黑不能飲食并諸虛乏不足氣少心悸不安

黃耆　當歸　芍藥　乾地黃　半夏各叁兩

茯苓　人參　桂　遠志　麥門冬

白术　澤瀉各貳兩　乾薑伍兩　棗叁拾个　五味子

甘草各壹兩

右㕮咀水一斗半煑取三升去滓一服五合日三夜一

人參荆芥散 治婦人血風勞氣胷膈不利經脉滯澁四肢拘急煩疼心多忪悸不能飲食漸加羸瘦

人參　荆芥　白术　柴胡　生地黃

酸棗仁　羚羊角　鱉甲　枳殼　桂各壹兩半

當歸　防風　甘草　牡丹皮　赤芍藥

芎各壹兩

右爲麁末每服二大錢水一盞薑三片煎至六分去滓食後服之

保生丹　補宮臓氣虚肢躰瘦倦

石斛　秦艽　熟地黄　貝母　糯米

防風　乾薑　甘草　細辛　桂各半兩

當歸　川椒　黄芩　大麻仁各壹兩半

大豆卷　石膏各七錢

右爲細末煉蜜和元如彈子大每服一元白湯下酒亦

得細嚼食前

鍾乳澤蘭煎 補虛損

鍾乳粉貳兩 澤蘭葉貳兩貳錢半 防風壹兩叁分 人參

栢子仁 麦門冬 熟乾地黄 石膏

石斛 芎 甘草 牛膝 山茱萸

乾山藥 當歸 白芷各壹兩半

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大每服三十元食前温酒下

羌活散 治婦人血風虛勞冷四肢羸瘦不能飲食面色萎黄腹内時痛

羌活 桃仁 鱉甲 熟乾地黄

牛膝各壹兩　白朮　白茯苓　續斷　川芎

附子　木香　當歸各叁分　防風　人參

白芍藥　桂心各半兩

右爲麁末每服四錢水一盞生薑半分煎至六分温服去滓不以時

補陰丹 治婦人血臓諸疾及諸淋病及經脉不行或産後餘血不盡變成血瘕皆治之

好朱砂　硇砂　延胡索　半夏麴　芫花

木香　斑猫各半兩　海蛤　荆三稜　黒附子

蓬莪朮　川練子　青皮各壹兩　肉豆蔻貳个　大檳榔叁个

茴香壹兩

右爲細末酒煮麵糊爲元如梧桐子大每服五七元空心温醋湯下

牡丹散 治婦人血臟虛風攻頭目不利可思飲食手足煩熱肢節拘急疼痛胷膈不利大腸不調陰陽相干心驚忪悸或時旋運身躰勞倦宜服

牡丹皮　川芎　枳殼各兩　桂　延胡索

京三稜　乾薑　羌活　半夏各半兩　陳皮

木香　白朮　赤芍藥　訶子肉各叁分

當歸壹兩止半　甘草半兩

重校定此方內三味無分兩此方靈苑方亦載之內枳殼川芎牡丹皮各壹兩

右爲細末每服二錢水半盞煎五七沸食前温服此方

婦人常服益血海退血風勞攻注消寒疾空脾胃理血氣攻刺及氣虛惡寒潮熱等病至妙

大勝金丸 治妊娠風冷氣血勞傷頭旋躰瞤怔忪驚悸寒熱往來心腹脇痛肢節煩倦赤白帶下胎氣不寧保養衝妊順政子道預服易產不痛善除產後一切病温中益氣進美飲食

牡丹　藁本　人參　白术　白芷
白薇　白茯苓　當歸　赤石脂　白芍藥
甘草　芎　没藥　延胡索各壹兩
桂貳兩

右爲細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸空心温酒下

白豆蔻元 治氣和胃

白豆蔻　丁香　木香　沉香　肉豆蔻

檳榔　甘草　青皮各半兩　白朮伍兩　茯苓

訶子皮　人參各壹兩　桂　乾薑各壹分　麝香壹分

重校定此方內麝香元分兩其太平聖惠方內利膈散与此方治療藥味相類止是元散不同內麝香合用壹分

右為細末煉蜜和元如櫻桃大每服一元生薑湯嚼下不以時

獨活散 治婦人風痹手足不隨身躰疼痛言語蹇澁筋脉攣急

獨活　桑寄生　牛膝　赤茯苓　桂

秦艽　防風　附子　生乾地黃　當歸各壹兩

杜仲　細辛　芎藭　赤芍藥各叄分

甘草半兩

右爲細末每服四錢水一中盞煎至六分去滓不以時溫服

人參散治婦人血風氣心煩驚悸恐畏恍惚神思不定少欲飲食四肢疼痛

人參　龍齒　茯神　熟乾地黃各壹兩

遠志　附子　細辛　桂　乾薑

防風　菖蒲　黄耆各半兩　當歸　白术各叄分

甘草壹分

右爲細末每服四錢水一盞生薑半分棗三枚煎至六

分去滓不以時溫服

續斷元 治婦人月水不斷口乾心煩四肢羸瘦喫食少味漸加乏弱

烏賊魚骨　續斷　當歸　牛角䚡

五味子　熟乾地黃　黃耆　赤石脂

甘草　龍骨各壹兩　附子　艾葉　乾薑

芎藭各叁分　白朮半兩

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大每服二十元食前溫酒下

慈白朮元 治婦人脾胃氣虛弱腹中疼痛時復吐逆不能下食四肢少力

白朮　附子各壹兩　木香　當歸　蓬莪茂

訶梨勒皮　芎藭　人參　乾薑

吴茱萸　桂心各半兩　甘草壹分　青橘皮　厚朴各叁分

右為細末酒煮麵糊為元擣三五百下如梧桐大每服二十元薑棗湯下不以時

琥珀散 治婦人血風勞

琥珀　没藥　木香　當歸　芍藥

芎　白芷　羌活　乾地黄　延胡索各半兩

土瓜根　牡丹皮　白朮　桂各壹兩

右為細末每服二盞水一盞煎至七分益酒三分復煎少時并滓熱服

北[illegible]散 治婦人血氣產後渴燥一切血邪乱語眼如血袋敗血上衝口鼻血出

硇砂　血竭　没藥各壹兩　海馬壹對　桂

木香　朱砂各壹分　乾漆貳兩　虻虫壹拾壹个

龍腦壹錢　水蛭拾肆个　當歸壹兩　鵬砂壹錢

阿魏壹分

右為細末一處和勻每服一錢冷水調下如產後血上衝口鼻血出用童子小便調服三服必効

烏頭當歸湯 主虛勞損胃腹滿痛攣急短氣面黃失色頭眩心煩夢寐失精寒氣肢節疼又兩脉不得喘息喘息輙牽痛逆害飲食悉皆主之

烏頭　獨活　白芍藥　蜀椒　白朮

人參各壹兩　厚朴肆兩　桂伍兩　麥門冬　細辛各壹兩

吴茱萸壹升　生薑　當歸　甘草各叁兩

右爲麁末每服三錢水一盞煎至七分去滓日三空心

川芎散治血臟氣不調腹脇脹滿煩躁吐逆頭昏身

躰疼痛可思飲食

牡丹　陳橘皮　芎　訶子各壹兩　木香

當歸　白朮　延胡索　荆三稜　半夏各叁分

甘草　乾薑　羌活各半兩　桂壹兩壹分

右爲細末每服三錢水二盞薑棗煎至七分去滓温服

不以時

桃仁湯治產後及墮身月水不調或淋瀝不斷斷即復來狀如瀉水四肢噓吸不能飲食腹中堅痛不可行動月水或前或後或經月不來舉躰沉重惟欲眠睡多思酸物

桃仁伍拾个 澤蘭 甘草 芎藭 人參各貳兩

牛膝 桂 當歸 牡丹皮各叁兩

芍藥 生薑 半夏各肆兩 地黃叁兩 蒲黃柒合

右㕮咀以水二斗煑取六升半分六服古之一升即今之一盞

防風散治婦人風邪癲狂或啼泣不止或歌笑無度或心神恐懼或言語失常

防風 茯神 獨活 遠志 人參

龍齒　菖蒲　石膏　牡礪各壹兩　秦艽

禹餘粮　桂各半兩　虵退　甘草各叄分

重校定此方内分兩皆錯太平聖惠方亦載之内防風茯神獨活遠志人參龍齒菖蒲石膏牡礪各壹兩秦艽禹餘粮桂各半兩蛇皮壹尺甘草叄分

右爲細末每服三錢水一盞煎至六分去滓不以時溫服

虎骨散 治婦人血風走疰痛無常處

虎骨頭　乾地黃各貳兩　敗龜　乾蝎

琥珀各半兩　當歸　葳靈仙　牛膝　羌活

肉桂各壹兩　天麻　川芎　没藥各叄分

右爲細末無時以溫酒調下二錢

龜甲散 治婦人赤白帶下腰膝疼痛

龜甲　禹餘粮　當歸　栢葉　厚朴各壹兩
人參　桑耳各叁分　白石脂貳兩　狗脊　白芍藥
桑寄生　桂心　吳茱萸各半兩
右爲細末每於食前以粥飲調下二錢

大補益當歸元 治虛羸不足胃中少氣腹內拘急腰疼引背崩漏帶下失血過多面目脫色唇口乾燥月水不調臍腹冷痛手足煩熱吸吸短氣憂恚不足精神減退散風冷補虛損美顏色養經血

當歸　續斷　乾薑　阿膠　甘草
芎各肆兩　白朮　吳茱萸　附子　白芷
白芍藥　桂各叁兩　熟地黃拾兩

右為細末水煑麵糊和元如梧桐子大每服二十元食前温酒下

小犀角元 消除瘡瘇

犀角屑弍兩 升麻 黄芩 防風 人參

當歸 黄耆 蓼藍 黄連 甘草

梔子各壹兩 大黄壹兩壹分 巴豆弍拾个

右為細末入巴豆研勻煉蜜和元如梧桐子大每服三五十元食後米飲下

紅花勝金散 治血虚寒熱頭目昏眩手足疼心腹痛

紅花 菊花 枳殼 茯苓 川芎

羌活 羚羊角 當歸 款冬花 芪

紅芍藥 烏蛇 桂

重校定此方内無分兩其太平聖惠方内紅藍花散与此方藥味同内紅花壹兩菊花枳殼茯苓川芎羌活秦艽羊角當歸款冬花茯紅芍藥烏蛇桂各半兩

右爲細末每服二錢炒小麥酒調下不以時

羌活牡丹散 治血臟虛風攻頭目不利可思飲食手足煩熱肢節拘急疼痛胷膈不利大腸不調陰陽相干心𢤱忪悸或時旋暈躰倦宜服

牡丹皮 川芎 枳殼各壹兩 桂 延胡索

甘草 羌活 半夏各半兩 陳皮 木香

白朮 訶子肉各叁分 當歸壹兩半

右爲細末每服二錢水一中盞煎五七沸食前温服此

藥婦人常服益血海退血風勞攻注消寒疾益脾胃理

血氣攻刺及氣虛惡寒潮熱等

沒藥散治血風氣攻刺疼痛

沒藥　延胡索　檳榔　青皮　桃仁

芫　當歸　荊三稜　木香　芎

桂各壹兩　白芷　紅花各半兩

右爲細末每服三錢水一盞煎至七分不以時

阿膠元治氣多血少衝實衰虛月信過期大能生血順氣

出顏色長肌膚益筋力

阿膠　熟地黃　牛膝各弍兩　桂弍錢　白芍藥半兩

五味子　黃耆　白茯苓　當歸　人參

牡丹皮　芎 各壹兩

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大空心棗湯下三十元日二一方有白术一兩

五味子散 治婦人心胷痰壅時有喘促咳嗽不欲飲食

五味子　橘皮　訶梨勒　白茯苓　前胡 各叁分

半夏　紫菀　枇杷葉　桔梗　杏仁

枳殼　甘草 各半兩

右爲細末每服二錢水一盞生薑三片煎至七分去滓温服不以時

萆薢煎 治婦人血風腰脚骨節酸疼筋脉攣急行履艱難兩脇抽痛

萆薢　牛膝　當歸　石斛　虎骨

附子各壹兩　酸棗仁　丹參　防風　杜仲

桂叁分　赤芍藥半兩

重校定此方內四味無分兩太平聖惠方內有萆薢元与此方藥味一同內酸棗仁丹參杜仲三味各壹兩防風叁分

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大空心酒下三十元

神麯元 療婦人腹內冷癖血塊虛脹月經不調瘦弱不能食面無顏色狀如傳尸病

神麯　大麥蘗　生地黄　牛膝　桑耳壹斤

白朮　薑黄各捌兩　當歸拾肆兩　桃仁　杏仁各拾貳兩

生薑壹斤　近用加橘皮捌兩

右切碎於臼中以木杵之如泥内餅中以物蓋之封勿令泄氣蒸於飯米中飯熟出之停屋下三日開出其乾爲末酒飲服方寸匕日二服漸加至一匕半初服十日内忌生冷難消之物以助藥勢過十日外即百無所忌任意恣口食之惟忌桃李若不能散服元之每服三十元令病人能食及駐顔色忌桃李雀肉蕪荑

麝香没藥散治血風毒氣攻注遊走肢節疼痛

麝香壹分　没藥　血竭　自然銅　枳實各半兩

當歸　牡丹皮　赤芍藥　骨碎補　瓜子各壹兩

虎骨　敗龜各貳兩

右爲細末每服二錢豆淋酒調下日二服不以時

大補中當歸湯 治産後虛損不足腹中拘急或溺血小腹苦痛或從高墜下犯內及金瘡血多內傷男子亦宜服

當歸 續斷 桂 芎藭 乾薑 麥門冬各弍兩 白芍藥 吴茱萸各肆兩 熟乾地黃陸兩 甘草 白芷 黃耆各弍兩

右為麁末每服四錢水一盞酒半盞棗二箇同煎至八分去滓食前温服

半夏茯苓湯 治妊娠阻病心中憒悶虛煩吐逆惡聞食氣頭重目眩四肢百節疼煩沉重多卧少起惡寒汗出疲極黃瘦 壹方无生薑

半夏 生薑各拾弍銖 茯苓 乾地黃各拾捌銖

黃橘皮　細辛　人參　白芍藥　旋覆花

芎藭　桔梗　甘草各拾貳銖

右十二味㕮咀以水一斗煮取三升分三服若病阻積及服藥冷熱失候病變下痢者去乾地黃入桂心十二銖若食少胃中虛大便閉塞小便赤少者加大黃十八銖去地黃加黃芩六銖餘依方服一劑得下後消息看氣候冷熱增損調定更服一劑湯便急服茯苓元令能食便強健也忌生冷醋滑油膩菘菜海藻

當歸湯大補中下虛弱

當歸　續斷　乾薑　麥門冬　芎

桂各參　白芍藥　吳茱萸各肆兩　黃耆

甘草　香白芷各弍两　熟地黄陸两

右為麁末水酒各半盞煎藥二錢至七分去滓　服不以時

龍鱗散治産後血暈煩悶不知人事或狂言乱語氣喘欲絶者

鯉魚皮　血餘各捌分　黄蟲　水蛭　川山甲各肆分

墨弍分　猪牙皂角貳分已上入餅子内泥固濟燒通赤放冷細研如粉

蒲黄肆分　麒麟竭　没藥各貳两　麝香壹分　琥珀貳分

右為細末以童子小便服一錢不以時産後纔覺惡心頭旋多涕唾身如在舡車中者速服之

莽草膏治婦人風瘙遍身生癮疹痒搔之隨手腫起

莽草叁分　當歸　芎藭　大戟　細辛

芫花　川椒　附子　躑躅花　吳茱

蒴藋根各壹兩　苦參半兩

右件細剉煉猪膏二斤入藥煎候附子黃色膏成去滓

傾入甆合中盛塗表病処日三用之

當歸散 治婦人血分腹脇膨脹四肢浮腫肩背壅悶

當歸　京三稜　鱉甲　檳榔各壹兩　赤茯苓

赤芍藥　桑白皮各貳分　川大黃貳兩

郁李仁壹兩半　牽牛子叁兩　桂心　枳殼各半兩

右為麁末每服四錢水一中盞生薑十片煎至六分去

滓食前温服

藁本細辛散治婦人因產血不足風邪客於皮膚以手搔之隨生癮疹方

藁本　細辛　芎　牡丹皮　人參

白朮　當歸　白芷　白茯苓　甘草

白芍藥

右等分為末温酒調一錢服米飲亦得

椒紅元治婦人血風氣臟腑虛冷全不思飲食臍腹多痛體瘦無力者

椒紅　沉香　附子　蓬莪茂　當歸

訶棃勒皮　白朮各壹兩　良薑　丁香

肉豆蔻各半兩　麝香壹分

右爲細末水煑麵糊和元梧桐子大每服二十元食前

温酒下

温經湯 治衝任經虛血氣不足小腹久冷崩中不止漏下

赤白或曾半産瘀血在腹内遶臍撮痛相引腰背咳唾涎

唇口乾燥五心煩熱奄忽眩冒寒熱倦怠月水過多及過

期不至不成妊 一方无芎麦門冬

吴茱萸 叁兩 當歸 白芍藥 芎 各貳兩 人參

桂 牡丹皮 阿膠 甘草 各壹兩 麦門冬

半夏 各貳兩半

右爲麄末每服三錢水一盞半生薑五片煎至八分去

滓食前温服

麥煎湯 治少男室女骨蒸婦人血風攻疰四肢心胷煩壅

鱉甲 大黃 常山 柴胡 赤茯苓

當歸 乾漆生 白朮 生地黃 石膏各壹兩

甘草半兩

右爲細末以水二盞小麥五十粒同煎食後臨卧服有虛汗加麻黃根一兩

海桐皮散 治婦人血風走疰疼痛不定

海桐皮 牛膝各壹兩 天南星 當歸 白附子

乾蝎 白殭蚕 川芎 沒藥 地龍各半兩

膩粉壹錢

右爲細末糯米飯和元菉豆大溫酒下[illegible]元不以時

金花散 治婦人産後血暈一切腹脇痛疼不以老少並皆治之

薑黃 熟地黃各弍兩 桂 牛膝

劉寄奴 虎杖 川芎 赤芍藥 蒲黃

乾葛各壹兩

右爲細末每服二錢如小可患酒水各半盞生薑煎至七分和滓温服病急暈豆淋酒調下

養陰膏 治室女氣血相傳經脉不行躰黄面腫多脹減食

生地黃壹兩半 當歸 赤芍藥 牛膝各壹兩

烏藥半兩 牡丹皮壹錢 茯苓 紅花炒令黄 水蛭壹錢

重校定此方内茯苓紅花无分兩其太平聖惠方内牡丹散與此方治療藥味相類紅花茯苓各用半兩

右爲細末煉蜜和元如彈子大每日空心好酒化下一元忌醋及酸物等

阿膠散治妊娠胎動時有所下腹脇疼痛一方加白朮白茯苓桑寄生各壹兩半

當帰　阿膠　芎藭各弍兩　艾葉　赤石脂

龍骨各半兩　熟乾地黄　黄耆各壹兩　甘草

乾薑各壹分

右爲細末每服四銭以水一中盞入生薑半分棗三个煎至六分去滓非時稍熱服

地楡當帰散治妊娠因損動下血腹痛不止

當帰　阿膠　地楡各壹分　白芍藥　白龍骨

熟艾　乾薑　蒲黄各半兩　熟乾地黄

牛角腮壹兩半

重校定此方內熟地黃无分兩太平聖惠方當歸散与此方治療一同藥味相類內熟乾地黃壹兩

右為細末每服二錢非時以粥飲調下

人參丸 治產後大虛心悸志意不安不自覺恍惚恐畏夜不得眠虛煩少氣

人參　甘草　茯苓各叁兩　麦門冬　菖蒲

澤瀉　薯蕷　乾薑各弍兩　桂壹兩　大棗伍拾枚

右為細末以蜜棗膏和丸如梧桐子大未食酒服二十丸日三夜一不効稍增更加遠志二兩為善若風氣當歸獨活三兩亦治男子虛損心悸

茯苓煎 治姙娠阻病心中煩悶頭眩重憎聞食氣嘔逆吐

悶顛倒四肢垂弱不自勝持

茯苓　人參　桂　乾薑　半夏

橘皮（各壹兩）　葛根　白朮　枳殻　甘草（各半兩）

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服二十元米飲下不以時候

阿膠白朮散 滋養胎氣調順榮衛

白朮（壹兩半）　白茯苓　白芍藥　當歸　熟地黄

人參　白芷　阿膠　芎（各壹兩）　甘草（叁分）

右為細末每服三錢水一盞煎至七分去滓温服不以時

寄生散 治妊娠胎動不安腹内疼痛下血不止

桑寄生　續断　芎藭各壹兩　龍骨叁分　當歸

伏龍肝　阿膠各壹兩　乾薑　甘草各壹分

右為細末每服三錢水一盞入生薑三片棗一枚煎至六分去滓空心食前温服

黄耆散 療婦人懷胎数落而不結實或寒冷熱百病之原

黄耆　吴茱萸　乾薑　人參　甘草

芎藭　白术　當歸　熟乾地黄各貳兩

右為細末清酒服一匕半日再服加至兩匕為剤忌海藻菘菜蕪荑桃李雀肉等

赤芍藥丸 治血虚腹脇疞痛

赤芍藥　艾葉　附子　乾薑各半兩　陳皮

當歸各壹兩　芎　甘草　吳茱萸各叁分

右爲細末煉蜜和元梧子大每服十元溫酒或醋湯下

艾茱元治血虛腹脇疠痛

艾葉　赤芍藥　乾薑　附子各半兩　陳皮

當歸各壹兩　芎叁分　吳茱萸　甘草各壹分

右爲細末煉蜜爲元如梧桐子大每服三十元酒或醋湯下

桑黃散治婦人風冷傷於衝任之脉經絡虛損致成白帶下

桑黃　烏賊魚骨　白石脂　鮑魚甲

白芍藥各壹兩　乾薑　吳茱萸　當歸各叁分

禹餘粮貳兩燒醋淬柒遍

右爲細末每於食前以粥飲調下二錢

馬藺湯治婦人風瘙癮疹身痒不止宜用此淋醮

馬藺　蒴藋根　茺蔚子　白礬　白蒺藜

茵芋　羊桃根　䓜花各貳兩　蓖麻葉壹兩

右爲細末以水二斗煑一斗去滓於避風処洗之

牛角䚡散治帶下四賁方一曰熱病下血二曰寒熱下血三曰經脉未斷舉重停住下血四曰産後臟開經利不断四賁之病外實內虛治之

牛角䚡伍个　鹿茸　當歸　禹餘粮　阿膠

乾薑　續斷各壹兩　烏賊魚骨半兩　赤小豆壹升

右爲細末用酒調一二錢不以時

交加元治婦人諸血妄行滋益榮衛補益衝妊

生地黄壹斤研爛取汁滓別置器中　生薑壹斤同上法

已上將生地黄汁炒生薑滓生薑汁炒地黄滓令乾入藥如後

白芍藥　人參　當歸　麥門冬　琥珀

阿膠　蒲黄各壹兩

右並爲細末煉蜜和元如梧桐子大每服二十元空心米飲下每服藥後以故舊紗帛一片包龍腦薄荷二兩以鼻聞其氣一方用白朮石斛各一兩無蒲黄用麥門冬治虛勞百疾

馬子得道人傳南岳魏夫人延壽内固丹用冬月大蘿蔔

作合子一箇令厚一指以上又深酌度盛藥或倉卒無大者只用朱砂三分之一

辰砂叁兩半　黑附子生　白朮各壹兩　沒藥半兩

木香壹兩　胡蘆巴壹兩半　硇砂半兩

人參壹兩

右硇砂沒藥朱砂細研餘藥別擣細爲末同羅研勻入蘿蔔合內先用赤石脂水調固合子縫外用六一泥六分膠泥一分紙筋固濟令厚一指巳上泥坐在塼上日氣中令五分乾用炭三斤煆合子上仍留一小竅子以竹片子試劄候蘿蔔熟爲度候合子竅子中氣出及泥乾蘿蔔熟抽火半炊飯許時再添一二斤火專守火候不

得令蘿蔔焦即恐藥敗以泥稍黃熟是候放令藥氣透
敲開泥切開蘿蔔取出丹自軟結而香急元如豌豆大
用塩湯温酒下三元或二元若以酒化下尤佳漸加至
五元止治百病返老還童治男子脾腎氣衰有積及腰
背冷面黃癱瘓中風婦人虛冷帶下蘿蔔須要有脉帶
五分湿下火此藥甚奇

牡丹皮散 治血風攻疰頭目疼痛遍身煩疼口苦舌乾多
困少力或發寒熱狀似傷寒

牡丹　赤芍藥　甘菊　防風貳兩　芎
半夏　羌活半壹兩　甘草壹兩

重校定此方伍件無分兩此方王氏博濟方亦載
之內牡丹赤芍藥甘菊各壹兩芎半夏各柒錢半

右爲細末每服二錢入生薑三片薄荷三葉水一盞同
煎至六分去滓臨卧熱服

吴茱萸湯 治婦人先有寒冷胷滿或心腹刺痛或嘔吐食
少或腫或寒或下痢氣息緜惙欲産後益劇此主之

吴茱萸貳兩 防風 桔梗 乾薑 甘草
細辛 當歸各拾貳銖 乾地黄拾捌銖

右爲麁末每服二錢水一盞煎至七分去滓放稍熱服
空心食前

黑神散 治産後諸疾

黑豆貳兩 白芍藥 熟地黄 當歸 甘草
乾薑 蒲黄 桂各兩

右為細末每服二錢食前温酒調下童子小便尤佳

白芷元 治產後所下過多及崩中傷損虛竭少氣面目脫色腹中疼痛

白芷伍兩 乾地黃肆兩 續斷 乾薑 當歸

阿膠各叁兩 附子 蒲黃各壹兩

右為細末煉蜜和元如梧桐子大酒下二十元日四五服食前

崩漏

崩漏白堊元 治婦人三十六疾胞中病漏下不絕

邯鄲白堊半兩 牡蠣 烏賊魚骨各拾捌銖

禹餘粮 白芷 白石脂 乾薑

龍骨　桂心　瞿麥　大黃　石韋
白斂　細辛　白芍藥　甘草　黃連
附子　當歸　茯苓　鐘乳　蜀椒
黃芩各半兩
右二十三味爲細末煉蜜爲元如梧子大空心酒服五元日再服不知加至十元

續斷地榆煎治崩漏

續斷　甘草　地榆　鹿茸　丹參
小薊根各拾叁銖　乾地黃壹兩半　亀甲叁兩
芎藭　阿膠　石脂　當歸各壹兩半　柏子人壹兩
秦牛角䚡叁兩

右十四味爲細末煉蜜和元如桐子大空心溫酒下十元日再稍加至三十元

栢葉散 治婦人崩中漏下不問年月遠近

栢葉　生地黄　續斷　鱉甲　當歸

芎藭各貳兩半　牡蠣　赤石脂　阿膠　艾葉

鹿茸　地榆各壹兩　禹餘粮貳兩半

右擣羅爲細末每於食前以粥飲調下二錢

小薊湯 療婦人崩中無問遠近悉主之

伏龍肝壹斤先於盆中以水弍斗令碎澄清取壹斗弍升用　桑寄生

續斷　地榆　艾葉各叁兩　阿膠　當歸

赤石脂　厚朴各貳兩　生薑伍兩　小薊根叁兩

右十味以伏龍肝水煮取三升絞去滓分三服

滋[illegible]丹 治血臟虛冷崩中漏下或月事頻多面色痿黃四肢少力臍腹疞刺腰膝疼痛

禹餘粮　烏金石各肆兩　龍骨　赤石脂

牡礪　艾各貳兩醋煮壹伏時　川烏頭　防風

芎各壹兩　吳茱萸　乾薑各半兩

右為細末醋煮麵糊為元如梧子大空心酒或醋服二三十元

當歸湯 治婦人忽暴崩中出血不斷或如鷄鴨肝者

小薊根陸兩　當歸　阿膠　續斷

青竹茹　芎藭各貳兩　生地黃別用熟者兩

地榆　釜下焦土 各肆兩　馬通 壹升以水調取汁

右爲麁末每服四錢水八分馬通汁二分同煎至五分濾去滓空心溫服用大盞頻服三四劑未愈止服前續斷地榆煎

白茅根散 治婦人崩中不止遶臍撮痛或時煩渴

伏龍肝　禹餘粮　白芍藥　熟地黄

地榆　白茅根 各肆兩　龍骨　當歸 各陸兩

甘草　麒麟竭

右爲麁末每服三錢水一盞煎至七分不以時服

小龜甲散 治婦人久虛赤白帶下腰腿疼痛面色萎黄四肢少力

龜甲壹兩半　桑耳　桑寄生　烏賊魚骨
當歸　栢葉各壹兩　白芍藥叁分　禹餘粮壹兩
吳茱萸半兩　芎藭叁分
右擣羅爲細末每於食前以温酒調下二錢

烏龍散 治婦人崩漏帶下赤白久不止或經脉不斷或暴下血不止

烏賊骨　椶皮　牛角腮　菩薩退
綿各肆兩　礬貳兩枯　乾薑壹兩
右並入瓶中泥固濟候乾入火煆赤放冷研細入麝香一錢同研細每服二錢空心服

桑耳散 治婦人崩中下血不止漸加虛困黄瘦

麝香壹分　晚蠶沙叁分　櫚皮貳兩　桑耳半兩

右件同研為散非時以熱酒調二錢

蠶灰散 治婦人崩中漏下

蠶紙灰　茶籠內箬葉燒灰各貳兩

右件細研每於食前溫酒下二錢

立効散 治崩漏下血不止

右取風化石灰一升以釅醋三升慢火煮令醋盡更炒令乾細研每服一錢以椶灰末一錢用溫酒一盞同調勻空心服之藥後復更進酒一盞以助藥力

雞峯普濟方卷第十五